



## Differentiële diagnose eosinofilie hond:

- Vlooiënallergie
- Voedselallergie
- Eosinofiele proliferatieve enteritis al dan niet in combinatie met darmparasieten, zoals spoelwormen
- Canine eosinofiele pneumonie
- Canine eosinofiele dermatitis al dan niet gepaard met infectie van *Sarcoptes scabiei*
- Gecombineerd met huidaandoeningen als Pemphigus foliaceus
- Idiopathisch hypereosinofiel syndroom
- Weefselparasieten als *Toxocara canis*
- Astma
- Pneumonie ondermeer ten gevolge van *Aelurostrongylus abstrusus* en *Angiostrongylus vasorum*
- Hartworm (*Dirofilaria immitis*)(met name in het zuiden van de EU)
- Eosinofiele leukemie
- Hypoadrenocorticisme/ziekte van Addison
- Purulente ontstekingsprocessen
- Paraneoplastisch
- Atopie als zeer ongewone associatie bij de hond
- Prevalent bij Rottweiler, Duitse Herder, Siberische Husky, Alaskan Malamute en Cavalier King Charles Spaniel

## Literatuur

- Lilliehöök I, Tvedten H. Investigation of hypereosinophilia and potential treatments. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2003 Nov;33(6):1359-78, viii.
- Vaughan DF, Clay Hodgkin E, Hosgood GL, Bernstein JA. Clinical and histopathological features of pemphigus foliaceus with and without eosinophilic infiltrates: a retrospective evaluation of 40 dogs. Vet Dermatol. 2010 Apr;21(2):166-74.